دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

شباهت‌ها و تفاوت‌های کووید **-19** و آنفلوآنزا

با ادامه مسیر تحول طغیان کووید -19، مقایسه‌هایی میان این بیماری با آنفلوآنزا انجام شده
میان این دو و شیوه انتشار آن‌ها وجود دارد. دانستن این تفاوت‌ها برای اجرای اقدامات بهداش

شباهت‌های کووید **-19** و آنفلوآنزا

نخست آنکه، کووید -19 و آنفلوآنزا علایم مشابهی دارند. بدین معنا که هر دو، بیماری تنفسی ایجاد می‌کنند. بیماری تنفسی ناشی از این دو ویروس به صورت طیفی از ناخوشی، از بدون علایم و با علایم خفیف، تا شدید و یا حتی مرگ بروز کند.

دوم آنکه، هر دو ویروس از طریق تماس، قطرک‌های تنفسی و مدفوع منتقل می‌شوند. در نتیجه، اقدامات بهداشتی نظیر رعایت بهداشت دست‌ها و آداب بهداشت تنفسی (سرفه در آرنج خمیده یا دستمال کاغذی و بلافاصله دور انداختن آن) به طور یکسان برای پیشگیری از ابتلا به هردو بیماری مهم هستند.

تفاوت‌های کووید **-19** و آنفلوآنزا

سرعت انتقال، تفاوت مهم میان این دو ویروس است. دوره نهفتگی یا کمون (از زمان ابتلا تا بروز علایم) در آنفلوآنزا نسبت به کووید -19 کوتاه‌تر و فاصله سرایت آن (زمان بین سرایت به نفر بعدی) نیز کوتاه‌تر است. براساس برآوردهای صورت گرفته، فاصله سرایت کووید -19، 5 الی 6 روز است. در حالی که فاصله سرایت ویروس آنفلوآنزا سه روز است. این بدان معناست که آنفلوآنزا سریع‌تر از کووید -19 انتشار پیدا می‌کند.

1 / 3

Phoca PDF

Phoca PDF

[illegible] 19-[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Phoca PDF