[illegible]

[illegible]

[illegible]

Phoca PDF

Phoca PDF

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

پزشکان توصیه می‌کنند همه افراد بالای شش ماه، واکسن آنفولانزا دریافت کنند؛ البته این واکسن برای افرادی که در طبقه‌بندی جزو گروه‌های پرخطر قرار می‌گیرند، اهمیت بسیار زیادی دارد. گروه‌های پرخطر که تزریق واکسن بیماری آنفولانزا برای آن‌ها حائز اهمیت بیشتری است، شامل بزرگسالان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، کودکان زیر پنج سال و افرادی که بر اثر بیماری‌های مزمن، سیستم ایمنی ضعیفی دارند، می‌شوند.

بیشتر پزشکان توصیه می‌کنند که افراد تا آخر ماه مهر، واکسن آنفولانزا را دریافت کنند. به این ترتیب بدن شما قبل از شروع فصل شیوع آنفولانزا، فرصت کافی برای تولید پادتن را دارد. بدن حدوداً به دو هفته زمان نیاز دارد تا بعد از واکسیناسیون، پادتن را تولید کند

4 / 4

Phoca PDF